



In ceea ce priveste
controlul tantarilor
suntem deja in viitor



**Aqua
K-Othrine®**

- ☑ Insecticid de contact si ingestie, formulat special pentru avio-tratamente si aplicare ULV
- ☑ Formulata pe baza unei tehnologii revolutionare anti-evaporare - FFAST™
- ☑ Indicata a se folosi numai in dilutie exclusiva cu apa
- ☑ Produs pe baza de apa - extrem de prietenos cu mediul, putand fi aplicat fara probleme pe vegetatie si in zone circulante

INSECTICID



DAUNATORI VIZATI:

Tantari, Muste
Chronomidae (libelule)
Simulidae (musca neagra)

COMPOZITIE:

100 ml de Aqua K-Othrine® contin:
Deltamethrin: 2 g (2%) ~ 20 g/L
Coformulanti: pana la 100 ml

FORMULARE:

EW – emulsie in dispersie apoasa cu tehnologia FFAST™

PROFIL TEHNIC:

CLASIFICARE TOXICOLOGICA:
Xn – nociv

CLASIFICARE DE MEDIU:
N – periculos pentru mediu

AVIZARE IN ROMANIA:
Nr. 148BIO/18/09.15
produs biocid (Grupa principala: 3, Tip produs: 18)

DOMENIUL SI ARIA DE UTILIZARE:


In exterior, in dezinsectiile sezoniere pentru combaterea insectelor daunatoare si generatoare de disconfort din mediul urban:

- ⊙ parcuri
- ⊙ cartiere de locuinte
- ⊙ artere de circulatie
- ⊙ zone de agrement
- ⊙ curti interioare
- ⊙ spatii deschise cu prezenta umana, etc.

Doze de aplicare recomandate si indicatii de utilizare:

Insecte	Tratament (exterior)	Dilutie Aqua	
		K-Othrine® + apa (L)	Doza de aplicare
Tantari, muste si alte insecte zburatoare	Tratament ULV- terestru (0,5 g deltamethrin / ha)	1+9	0,5 L sol./ ha
		1+79	2 L sol./ ha
	Tratament ULV- aerian (1 g deltamethrin / ha)	1+9	0,5 L sol./ ha
		Tratament pe vegetatie densa (1 g deltamethrin / ha)	1+39
	Termonebulizare ("ceata rece") (1 g deltamethrin / ha)	1+99	5 L sol./ ha

¹⁾ pentru doze de aplicare mai mari de 2L/ha, consultati producatorul/importatorul pentru recomandarea unei solutii personalizate



Bayer

S.C. Bayer S.R.L.

Sos. Pipera nr. 42, etaj 1, 16 si 17

020112, sector 2, Bucuresti

Tel: +40 (021) 529 59 00 | Fax: +40 (021) 529 59 92