

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: \*(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

**CERTIFICAT PENTRU AUTORIZAREA PRODUSULUI BIOCID  
Nr. RO/2019/0064/MRA/ IE/BPA 70509**

In conformitate cu prevederilor REGULAMENTULUI (UE) NR. 528/2012 al Parlamentului European si al Consiliului privind punerea la dispozitie pe piata si utilizarea produselor biocide si ale HOTARÂRII GUVERNULUI nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului institutional si a unor masuri pentru punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 22 mai 2013 privind punerea la dispozitie pe piata si utilizarea produselor biocide, in baza documentelor depuse in dosarul tehnic, Comisia Nationala pentru Produse Biocide, in sedinta din data 4.03.2019, a decis ca produsul biocid poate fi plasat pe piata in Romania, conform prevederilor legale in vigoare.

**I. TIPUL AUTORIZATIEI**

*autorizația prin recunoașterea reciprocă succesivă* eliberată în conformitate cu prevederile art. 33 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012;

- Statul membru al Uniunii Europene emitent: UK
- Nr. Autorizației din statul membru emitent Nr.: **IE/BPA 70509**

**II. Data emiterii autorizatiei: 03.04.2019****III. Data expirării autorizatiei: 14.03.2023****IV.****DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI BIOCID: VERTOX PASTA BAIT RED****V.****NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI: PelGar International**

Adresa : Unit 13, Newman Lane, Alton, Hampshire, GU34 2QR, Marea Britanie

**NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI recunoscută reciproc: PelGar International**

Adresa : Unit 13, Newman Lane, Alton, Hampshire, GU34 2QR, Marea Britanie

**NUMELE FABRICANTULUI PRODUSULUI BIOCID : PelGar International Limited**

Adresa : Unit 13, Newman Lane, Alton, Hampshire, GU34 2QR, Marea Britanie

Loc de productie : Unit 13, Newman Lane, Alton, Hampshire, GU34 2QR, Marea Britanie

**NUMELE FABRICANTULUI SUBSTANTEI ACTIVE: PelGar International Limited**

Adresa : Unit 13, Newman Lane, Alton, Hampshire, GU34 2QR, Marea Britanie

Loc de productie : **PelGar International Limited**, Prazska 54, 280 02, Kolin, Republica Ceha**VI.****TIPUL DE PRODUS: TP 14-Rodenticide**

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: \*(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

**VII.****CATEGORIILE DE UTILIZATORI** : Profesioniști, profesioniști cu instruire**VIII.****TIPUL PREPARATULUI:** Momeală pastă gata de utilizare pentru a se folosi ca un rodenticid de către publicul general, profesioniști și profesioniști instruiți pentru controlul șobolanilor gri *Rattus norvegicus* și șoarecilor de casă *Mus Musculus* - în interior, exterior în jurul clădirilor, în sistemul de canalizare.**IX. COMPOZITIA CALITATIVĂ SI CANTITATIVĂ****1) Substanța activă**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Denumirea comună             | Brodifacoum  |
| Denumirea IUPAC              | 3-[3-[4-(4-bromophenyl)phenyl]tetralin-1-yl]-2-hydroxy-chromen-4-one |
| Numar CAS                    | 56073-10-0   |
| Numar CE                     | 259-980-5  |
| Continut de substanță activă | 0,0025%  |

**2) Substanța inactivă/nonactivă – nu se specifica****X. CLASIFICAREA SI ETICHETAREA PRODUSULUI****Produs biocid cu substanțe active - substanțe chimice**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Simboluri             | GHS08  |
| Fraze de pericol (H)  | H373 – Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată<br>EUH 401 – Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.  |
| Fraze de prudență (P) | P102 – A nu se lăsa la îndemana copiilor.<br>P103 – Citiți eticheta înainte de utilizare.<br>P220 – A se păstra/depozita departe de îmbrăcăminte/.../materiale combustibile.<br>P262 – Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcăminte.<br>P270 – A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.<br>P273 – Evitați dispersarea în mediu.<br>P280 – Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.<br>P301 + P310 – ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.<br>P404 +P405– A se depozita într-un recipient închis.A se depozita sub cheie.<br>P501 – Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu prevederile hotararilor municipale |
| Pictograme            |  |



## **XI. AMBALAREA**

Utilizatori:

Profesionisti (interior) soareci

Dimensiunea minimă a ambalajului este de 2,5 kg.

10, 12 sau 15 g momeală ambalată individual în hârtie de ceai, hârtie comestibilă ambalată în:

- container PE / PP exterior (tuburi sau coșuri);
- cutii de carton căptușite PE sau carton , pungi PE în cutii de carton;
- hârtie / PE / PE / AL, PP, PET / PE sau pungi PP laminate- vândute așa cum sunt sau în cutii de carton;

Dimensiuni ambalaje exterioare: 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg , 4,5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18kg, 19kg, 20kg;

Momeală liberă ambalată în tăvi din fibre de sticlă, PVC, PS, PET / PE, PP sau PE (10g, 15g sau 20g), cu un capac etanșat la cald. Tăvile sunt ambalate în multiplii, în cutii din carton.

Dimensiuni ambalaj: 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg 4,5 kg, 5 kg 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18kg, 19kg, 20kg;

Momeală pastă liberă ambalată în tăvi de momeală PP sau PE cu un capac etanșat la cald (10g, 15g sau 20g). Tăvițele sunt ambalate în stații de momeală HDPE sau PP pentru momeală cu o singură utilizare sau stație reîncărcabilă rezistentă la acțiuni externe. Toate ambalate în multipli de 1/2/4 într-un ambalaj din carton la exterior sau blister sau din manșon din carton sau pungă sigilată prin căldură sau pungă din polieestiren închisă termic și cu capac din carton.

Dimensiuni ambalaj: 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg 4,5 kg, 5 kg 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18kg, 19kg, 20kg;

1 sau 2 x 10g t-pungi ambalate într-o stație de momeală pentru șoareci HDPE sau PP de unică folosință sau reîncărcabilă, cu protecție la manipulare toate ambalate în multipli de 1, 2 sau 4 într-un ambalaj din carton sau blister sau pungi sigilate termic sau pungă poliestirenă sigilată termic și cu capac din carton.

Pachete multiple în cutii:

20g - 144

40g - 72, 96, 120, 144

80g - 32, 48, 60, 72, 96

1 x 12g de t-pungi ambalate într-o stație de momeală HDPE sau PP pentru șoareci cu unică folosință sau reîncărcabilă rezistentă la manipulare, toate ambalate în multipli de 1, 2 sau 4 într-un ambalaj din carton sau blister sau într-un manșon din carton sau pungi sigilate termic sau pungă poliestirenă sigilată termic și cu capac din carton.

Pachete multiple în cutii:

24g - 120, 144

48g - 60, 72, 96, 120, 144

96g - 32, 48, 60, 72, 96

Pungi de 1 x 15g ambalate într-o stație de momeală HDPE sau PP pentru șoareci cu unică folosință sau reîncărcabilă rezistentă la manipulare , toate ambalate în multipli de 1, 2, 3 sau 4 într-un ambalaj din carton sau din blister sau dintr-un manșon din carton sau pungi sigilate termic sau pungă poliestirenă sigilată termic și cu capac din carton.

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: \*(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



Pachete multiple în cutii:

30g - 96, 120, 144

45g - 60, 72, 96, 120

60g - 48, 60, 72, 96

Momeală pastă în pachete PP sau PE pentru aplicare cu cuțitul / spatulul decoratorului.

Mărimea ambalajului: 2,5kg, 3kg 4,0kg sau 5,0kg.

Momeală pastă în cartuș lipit PE sau PP, etichetat cu sau fără ambalaj exterior din carton. Cartușele sunt de 50g, 100g, 150g, 200g sau 300g.

Mărimea ambalajului: 300g \*, 600g \*, 900g \*, 1,2 kg \* 1,8 kg \*, 2,4 kg \*, 3,6 kg

\* Excepție la mărimea minimă a pachetului pentru aceste momeli profesionale de specialitate care sunt utilizate în cantități foarte mici de către un controlor individual al dăunătorilor.

Profesionisti (interior) șobolani

Dimensiunea minimă a ambalajului este de 2,5 kg \*

10, 12 sau 15 g momeală ambalată individual în hârtie de ceai, hârtie comestibilă ambalată în:

- container PE / PP exterior (tuburi sau găleți);

- cutii de carton căptușite PE sau carton , pungi PE în cutii de carton;

- hârtie / PE / PE / AL, PP, PET / PE sau pungi PP laminate- vândute așa cum sunt sau în cutii de carton;

Dimensiuni ambalaje exterioare: 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg , 4,5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18kg, 19kg, 20kg;

Momeală liberă ambalată în tăvi din fibre de sticlă, PVC, PS, PET / PE, PP sau PE (10g, 15g, 20g, 25g,30g,40g, 50g sau 60g), cu un capac etanșat la cald. Tăvile sunt ambalate în multipli, în cutii din carton.

Dimensiuni ambalaj: 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg 4,5 kg, 5 kg 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18kg, 19kg, 20kg;

Momeală liberă ambalată în tăvi de momeală PP sau PE cu un capac etanșat la cald (10g, 15g, 20g, 10g, 15g, 20g, 25g,30g,40g, 50g sau 60g). Tăvițele sunt ambalate în stații de momeală HDPE sau PP pentru momeală cu o singură utilizare sau stație reîncărcabilă rezistentă acțiunii externe. Toate ambalate în multipli de 1/2/4 într-un ambalaj din carton la exterior sau blister sau din manșon din carton sau pungă sigilată prin căldură sau pungă din polieestiren închisă termic cu un capac din carton.

Dimensiuni ambalaj: 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg 4,5 kg, 5 kg 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18kg, 19kg, 20kg;

1, 2sau 3 x 15g t-pungi securizate prin fixarea pe o bară de metal într-o stație de momeală de unică folosință sau reîncărcabilă pentru șobolani HDPE sau PP , cu protecție la manipulari toate ambalate în multipli de 1, 2 sau 4 într-un ambalaj din carton sau din blister sau din carton sau pungi sigilate termic sau polială exterioară sigilată cu căptușeală din carton.

Pachete multiple în cutii:

30g – 96, 120, 144

45g – 60, 72, 96, 120

60g – 48, 60, 72, 96

90g – 32, 48, 60, 72

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDALE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: \*(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



120g – 32, 48, 60, 72

180g – 16, 24, 32, 48

1, 2, 3, 4 sau 5 x 10g t-pungi fixate pe o bară metalică fixă într-o stație de momeală HDPE sau PP pentru șobolani de unică folosință sau reîncărcabilă, ambalate în multipli de 1, 2, 3 sau 4 într-un ambalaj exterior din carton sau blister sau manșon din carton sau pungă din polieestiren închisă termic și cu un capac din carton.

Pachete multiple în cutii:

10g – 250

20g – 120

30g – 96, 120, 144

40g – 72, 96, 120, 144

50g – 60, 72, 96, 120, 144

60g – 48, 60, 72, 96, 120

80g – 32, 48, 60, 72, 96

90g – 32, 48, 60, 72, 96

100g – 32, 48, 60, 72, 96

120g – 24, 32, 48, 60, 72

150g – 24, 32, 48, 60, 72

160g – 16, 24, 32, 48, 60, 72

200g – 16, 24, 32, 48, 60

Momeală pastă în pachete PP sau PE pentru aplicare cu cuțitul / spatula decoratorului.

Mărimea ambalajului: 2,5kg, 3kg 4,0kg sau 5,0kg.

Momeală pastă în cartuș lipit PE sau PP, etichetat cu sau fără ambalaj exterior din carton. Cartușele sunt de 50g, 100g, 150g, 200g sau 300g.

Mărimea ambalajului: 300g \*, 600g \*, 900g \*, 1,2 kg \*, 1,8 kg \*, 2,4 kg \*, 3,6 kg

\* Excepție la mărimea minimă a pachetului pentru aceste momeli profesionale de specialitate care sunt utilizate în cantități foarte mici de către un controlor individual al dăunătorilor.

Profioniști în exterior, în jurul clădirilor pentru utilizare împotriva soarecilor și/sau șobolanilor

Dimensiunea minimă a pachetului de 2,5 kg \*.

10, 12 sau 15 g momeală ambalată individual în hârtie de ceai, hârtie comestibilă ambalată în:

- container PE / PP exterior (tuburi sau găleți);

- cutii de carton căptușite PE sau carton, pungi PE în cutii de carton;

- hârtie / PE / PE / AL, PP, PET / PE sau pungi PP laminate- vândute așa cum sunt sau în cutii de carton;

Dimensiuni ambalaje exterioare: 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 4,5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18kg, 19kg, 20kg;

Momeală liberă ambalată în tăvi din fibre de sticlă, PVC, PS, PET / PE, PP sau PE (10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 40g, 50g sau 60g), cu un capac etanșat la cald. Tăvile sunt ambalate în multipli, în cutii din carton.

Dimensiuni ambalaj: 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 4,5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18kg, 19kg, 20kg;

Momeală liberă ambalată în tăvi de momeală PP sau PE cu un capac etanșat la cald (10g, 15g, 20g,

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: \*(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 40g, 50g sau 60g). Tăvițele sunt ambalate în stații de momeală HDPE sau PP pentru momeală cu o singură utilizare sau stație reîncărcabilă rezistentă acțiunii externe. Toate ambalate în multipli de 1/2/4 într-un ambalaj din carton la exterior sau blister sau din manșon din carton sau pungă sigilată prin căldură sau pungă din polieestiren închisă termic cu un capac din carton.

Dimensiuni ambalaj: 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 4,5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18kg, 19kg, 20kg;

1 sau 2 x 10g t-pungi ambalate într-o stație de momeală de unică folosință sau reîncărcabilă pentru șoareci HDPE sau PP, cu protecție la manipulări toate ambalate în multipli de 1, 2 sau 4 într-un ambalaj din carton sau din blister sau din carton sau pungi sigilate termic sau sau pungă din polieestiren închisă termic și cu un capac din carton.

Mărimea ambalajului:

Pachete multiple în cutii:

20g – 144

40g – 72, 96, 120, 144

80g – 32, 48, 60, 72, 96

1 x 12 g t-pungi ambalate într-o stație de momeală HDPE sau PP pentru șoareci de unică folosință sau reîncărcabilă, ambalate în multipli de 1, 2 sau 4 într-un ambalaj exterior din carton sau blister sau manșon din carton sau pungă din polieestiren închisă termic și cu un capac din carton.

Pachete multiple în cutii:

24g – 120, 144

48g – 60, 72, 96, 120, 144

96g – 32, 48, 60, 72, 96

1 x 15g t-pungi ambalate într-o stație de momeală de unică folosință sau reîncărcabilă pentru șoareci HDPE sau PP, cu protecție la manipulări toate ambalate în multipli de 1, 2, 3 sau 4 într-un ambalaj din carton sau din blister sau din carton sau pungi sigilate termic sau sau pungă din polieestiren închisă termic și cu un capac din carton.

Pachete multiple în cutii:

30g – 96, 120, 144

45g – 60, 72, 96, 120

60g – 48, 60, 72, 96

1, 2 sau 3 x 15g t-pungi securizate prin fixarea pe o bară de metal într-o stație de momeală de unică folosință sau reîncărcabilă pentru șobolani HDPE sau PP, cu protecție la manipulări toate ambalate în multipli de 1, 2 sau 4 într-un ambalaj din carton sau din blister sau din carton sau pungi sigilate termic sau polială exterioară sigilată cu căptușeală din carton.

Pachete multiple în cutii:

30g – 96, 120, 144

45g – 60, 72, 96, 120

60g – 48, 60, 72, 96

90g – 32, 48, 60, 72

120g – 32, 48, 60, 72

180g – 16, 24, 32, 48

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDALE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: \*(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



1, 2, 3, 4 sau 5 x 10g t-pungi fixate pe o bară metalică fixă într-o stație de momeală HDPE sau PP pentru șobolani de unică folosință sau reîncărcabilă, ambalate în multipli de 1, 2, 3 sau 4 într-un ambalaj exterior din carton sau blister sau manșon din carton sau pungă din polieestiren închisă termic și cu un capac din carton.

Pachete multiple în cutii:

10g – 250

20g – 120

30g – 96, 120, 144

40g – 72, 96, 120, 144

50g – 60, 72, 96, 120, 144

60g – 48, 60, 72, 96, 120

80g – 32, 48, 60, 72, 96

90g – 32, 48, 60, 72, 96

100g – 32, 48, 60, 72, 96

120g – 24, 32, 48, 60, 72

150g – 24, 32, 48, 60, 72

160g – 16, 24, 32, 48, 60, 72

200g – 16, 24, 32, 48, 60

Momeală pastă în pachete PP sau PE pentru aplicare cu cuțitul / spatula decoratorului.

Mărimea ambalajului: 2,5kg, 3kg 4,0kg sau 5,0kg.

Momeală pastă în cartuș lipit PE sau PP etichetat cu sau fără ambalaj exterior din carton. Cartușele sunt de 50g, 100g, 150g, 200g sau 300g.

Mărimea ambalajului: 300g \*, 600g \*, 900g \*, 1,2 kg \*, 1,8 kg \*, 2,4 kg \*, 3,6 kg

\* Excepție la mărimea minimă a pachetului pentru aceste momeli profesionale de specialitate care sunt utilizate în cantități foarte mici de către un controlor individual al dăunătorilor.

Profesioniști instruiți - soareci și/sau șobolani - interior

Dimensiunea minimă a pachetului de 2,5 kg, cu excepția dimensiunilor cartușelor marcate cu asterisc (\*) de mai jos.

10, 12 sau 15 g momeală ambalată individual în hârtie de ceai, hârtie comestibilă ambalată în: -

--- container PE / PP exterioră (tuburi sau găleți)

- cutii de carton căptușite PE sau carton , pungi PE în cutii de carton;

- hârtie / PE / PE / AL, PP, PET / PE sau pungi PP laminate- vândute așa cum sunt sau în cutii de carton;

Ambalaje exterioare: PE PP container (tub sau găleată )2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg 4,5 kg, 5 kg 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg 16kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg 20 kg.

Momeală liberă ambalată în tăvi din fibre de sticlă, PVC, PS, PET / PE, PP sau PE (10g, 15g, 20g, 25g,30g,40g, 50g sau 60g), cu un capac etanșat la cald. Tăvile sunt ambalate în multiplii, în cutii din carton.

Dimensiuni ambalaj: 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg 4,5 kg, 5 kg 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18kg, 19kg, 20kg;

Momeală liberă ambalată în tăvi de momeală PP sau PE cu un capac etanșat la cald (10g, 15g, 20g, 10g, 15g, 20g, 25g,30g,40g, 50g sau 60g). Tăvițele sunt ambalate în stații de momeală HDPE sau

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: \*(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



PP pentru momeală cu o singură utilizare sau stație reîncărcabilă rezistentă acțiunii externe. Toate ambalate în multipli de 1/2/4 într-un ambalaj din carton la exterior sau blister sau din manșon din carton sau pungă sigilată prin căldură sau pungă din poliestiren închisă termic cu un capac din carton.

Dimensiuni ambalaj: 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 4,5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18kg, 19kg, 20kg;

1 sau 2 x 10g de t-pungi ambalate într-o stație de momeală HDPE sau PP pentru momeală cu un singur sau multiplu de utilizare, toate ambalate în multipli de 1, 2 sau 4 într-un ambalaj din carton sau din blister sau din manșon din carton sau pungă sigilate termic sau pungă poliestirenă închisă la cald și cu un capac din carton

Pachete multiple de momeală în cutii:

20g - 144

40g - 72, 96, 120, 144

80g - 32, 48, 60, 72, 96

Pungi de 1 x 12 g t-pungi ambalate într-o stație de momeală HDPE sau PP pentru șoareci cu unică utilizare sau stație reîncărcabilă, rezistentă la acțiunii externe, ambalate în multiplii de 1, 2 sau 4 într-un ambalaj din carton sau blister sau manșon sau pungă sigilată la cald sau pungă poliestirenă sigilat termic și la exterior cu un capac de carton .

Pachete multiple de momeală în cutii:

24g - 120, 144

48g - 60, 72, 96, 120, 144

96g - 32, 48, 60, 72, 96

Pungi de 1 x 15g t – pungi ambalate într-o stație de momeală HDPE sau PP pentru șoareci cu o singură utilizare sau reîncărcabilă, ambalate în multiplii de 1, 2, 3 sau 4 într-un ambalaj din carton sau blister sau dintr-un manșon din carton sau pungi sigilate termic sau pungă poliestirenă închisă la cald și cu un capac din carton.

Pachete multiple de momeală în cutii:

30g - 96, 120, 144

45g - 60, 72, 96, 120

60g - 48, 60, 72, 96

1, 2 sau 3 x 15 g t-pungi fixate pe o bară metalică fixă într-o stație de șobolan HDPE sau PP de șobolan cu un singur sau multiplu de utilizare, ambalate în multipli de 1, 2 sau 4 într-o cutie de carton exterioară sau blister sau într-un manșon din carton sau pungi sigilate termic sau pungă poliestirenă închisă la cald și cu un capac din carton.

Multiple cutii pentru șobolani în ambalaj:

30g - 96, 120, 144

45g - 60, 72, 96, 120

60g - 48, 60, 72, 96

90g - 32, 48, 60, 72

120g - 32, 48, 60, 72

180g - 16, 24, 32, 48

1, 2, 3, 4 sau 5 x 10g t-pungi fixate pe o bară metalică fixă într-o stație de momeală HDPE sau PP de



**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDALE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: \*(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



momeală pentru șobolani unică sau multifuncțională, ambalate în multipli de 1, 2, 3 sau 4 în carton exterior sau blister sau manșon din carton sau pungă sigilată la cald sau manșon din carton sigilat termic cu un capac din carton

Multiple cutii pentru șobolani în ambalaj:

10g -250

30g - 96, 120, 144

40g - 72, 96, 120, 144

50g - 60, 72, 96, 120, 144

60g - 48, 60, 72, 96, 120

80g - 32, 48, 60, 72, 96

90g - 32, 48, 60, 72, 96

100g - 32, 48, 60, 72, 96

120g - 24, 32, 48, 60, 72

150g - 24, 32, 48, 60, 72

160g - 16, 24, 32, 48, 60, 72

200g - 16, 24, 32, 48, 60

Momeală pastă în pachete PP sau PE pentru aplicare cu cuțitul / spatulul decoratorului.

Mărimea ambalajului: 2,5kg, 3kg 4,0kg sau 5,0kg.

Momeală pastă în cartuș lipit PE sau PP, etichetat cu sau fără ambalaj exterior din carton. Cartușele sunt de 50g, 100g, 150g, 200g sau 300g.

Mărimea ambalajului: 300g \*, 600g \*, 900g \*, 1,2 kg \*, 1,8 kg \*, 2,4 kg \*, 3,6 kg

\* Excepție la mărimea minimă a pachetului pentru aceste momeli profesionale de specialitate care sunt utilizate în cantități foarte mici de către un controlor individual al dăunătorilor.

Profesioniști instruiți - șoareci și/sau șobolani – exterior în jurul clădirilor

Dimensiunea minimă a pachetului de 2,5 kg, cu excepția dimensiunilor cartușelor marcate cu asterisc (\*) de mai jos.

10, 12 sau 15 g momeală ambalată individual în hârtie de ceai, hârtie comestibilă ambalată în:

- container PE / PP exterioară (tuburi sau găleți)
- cutii de carton căptușite PE sau carton , pungi PE în cutii de carton;
- hârtie / PE / PE / AL, PP, PET / PE sau pungi PP laminate- vândute așa cum sunt sau în cutii de carton;

Ambalaje exterioare: PE PP container (tub sau găleată )2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg 4,5 kg, 5 kg 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg 16kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg 20 kg.

Momeală liberă ambalată în tăvi din fibre de sticlă, PVC, PS, PET / PE, PP sau PE (10g, 15g, 20g, 25g,30g,40g, 50g sau 60g), cu un capac etanșat la cald. Tăvile sunt ambalate în multiplii, în cutii din carton.

Dimensiuni ambalaj: 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg 4,5 kg, 5 kg 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18kg, 19kg, 20kg;

Momeală liberă ambalată în tăvi de momeală PP sau PE cu un capac etanșat la cald (10g, 15g, 20g, 10g, 15g, 20g, 25g,30g,40g, 50g sau 60g). Tăvițele sunt ambalate în stații de momeală HDPE sau PP pentru momeală cu o singură utilizare sau stație reîncărcabilă rezistentă acțiunii externe. Toate ambalate în multipli de 1/2/4 într-un ambalaj din carton la exterior sau blister sau din manșon din



**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDALE**

**MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: \*(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



carton sau pungă sigilată prin căldură sau pungă din poliestiren închisă termic cu un capac din carton.

Dimensiuni ambalaj: 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 4,5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18kg, 19kg, 20kg;

1 sau 2 x 10g de t-pungi ambalate într-o stație de momeală HDPE sau PP pentru momeală cu un singur sau multiplu de utilizare, toate ambalate în multipli de 1, 2 sau 4 într-un ambalaj din carton sau din blister sau din manșon din carton sau pungi sigilate termic sau pungă poliestirenă închisă la cald și cu un capac din carton

Pachete multiple de momeală în cutii:

20g - 144

40g - 72, 96, 120, 144

80g - 32, 48, 60, 72, 96

Pungi de 1 x 12 g t-pungi ambalate într-o stație de momeală HDPE sau PP pentru șoareci cu unică utilizare sau stație reîncărcabilă, rezistentă la acțiuni externe, ambalate în multipli de 1, 2 sau 4 într-un ambalaj din carton sau blister sau manșon sau pungă sigilată la cald sau pungă poliestirenă sigilat termic și la exterior cu un capac de carton .

Pachete multiple de momeală în cutii:

24g - 120, 144

48g - 60, 72, 96, 120, 144

96g - 32, 48, 60, 72, 96

Pungi de 1 x 15g t – pungi ambalate într-o stație de momeală HDPE sau PP pentru șoareci cu o singură utilizare sau reîncărcabilă, ambalate în multipli de 1, 2, 3 sau 4 într-un ambalaj din carton sau blister sau dintr-un manșon din carton sau pungi sigilate termic sau pungă poliestirenă închisă la cald și cu un capac din carton.

Pachete multiple de momeală în cutii:

30g - 96, 120, 144

45g - 60, 72, 96, 120

60g - 48, 60, 72, 96

1, 2 sau 3 x 15 g t-pungi fixate pe o bară metalică fixă într-o stație de șobolan HDPE sau PP de șobolan cu un singur sau multiplu de utilizare, ambalate în multipli de 1, 2 sau 4 într-o cutie de carton exterioră sau blister sau într-un manșon din carton sau pungi sigilate termic sau pungă poliestirenă închisă la cald și cu un capac din carton.

Multiple cutii pentru șobolani în ambalaj:

30g - 96, 120, 144

45g - 60, 72, 96, 120

60g - 48, 60, 72, 96

90g - 32, 48, 60, 72

120g - 32, 48, 60, 72

180g - 16, 24, 32, 48

1, 2, 3, 4 sau 5 x 10g t-pungi fixate pe o bară metalică fixă într-o stație de momeală HDPE sau PP de momeală pentru șobolani unică sau multifuncțională, ambalate în multipli de 1, 2, 3 sau 4 in carton exterior sau blister sau manșon din carton sau pungă sigilată la cald sau manșon din carton sigilat

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: \*(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



termic cu un capac din carton

Multiple cutii pentru șobolani în ambalaj:

10g -250

30g - 96, 120, 144

40g - 72, 96, 120, 144

50g - 60, 72, 96, 120, 144

60g - 48, 60, 72, 96, 120

80g - 32, 48, 60, 72, 96

90g - 32, 48, 60, 72, 96

100g - 32, 48, 60, 72, 96

120g - 24, 32, 48, 60, 72

150g - 24, 32, 48, 60, 72

160g - 16, 24, 32, 48, 60, 72

200g - 16, 24, 32, 48, 60

Momeală pastă în pachete PP sau PE pentru aplicare cu cuțitul / spatulul decoratorului.

Mărimea ambalajului: 2,5kg, 3kg 4,0kg sau 5,0kg.

Momeală pastă în cartuș lipit PE sau PP, etichetat cu sau fără ambalaj exterior din carton. Cartușele sunt de 50g, 100g, 150g, 200g sau 300g.

Mărimea ambalajului: 300g \*, 600g \*, 900g \*, 1,2 kg \*, 1,8 kg \*, 2,4 kg \*, 3,6 kg

\* Excepție la mărimea minimă a pachetului pentru aceste momeli profesionale de specialitate care sunt utilizate în cantități foarte mici de către un controlor individual al dăunătorilor.

Profesionisti instruiți- șobolani-canale

Dimensiunea minimă a pachetului de 2,5 kg, cu excepția dimensiunilor cartușelor marcate cu asterisc (\*) de mai jos.

10, 12 sau 15 g momeală ambalată individual în hârtie de ceai, hârtie comestibilă ambalată în: container PE / PP exterioară (tuburi sau găleți)

- cutii de carton căptușite PE sau carton , pungi PE în cutii de carton;

- hârtie / PE / PE / AL, PP, PET / PE sau pungi PP laminate- vândute așa cum sunt sau în cutii de carton;

Ambalaje exterioare: PE PP container (tub sau găleată )2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg 4,5 kg, 5 kg 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg 16kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg 20 kg.

Momeală liberă ambalată în tăvi din fibre de sticlă, PVC, PS, PET / PE, PP sau PE (10g, 15g, 20g, 25g,30g,40g, 50g sau 60g), cu un capac etanșat la cald. Tăvile sunt ambalate în multiplii, în cutii din carton.

Dimensiuni ambalaj: 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg 4,5 kg, 5 kg 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18kg, 19kg, 20kg;

Momeală liberă ambalată în tăvi de momeală PP sau PE cu un capac etanșat la cald (10g, 15g, 20g, 10g, 15g, 20g, 25g,30g,40g, 50g sau 60g). Tăvițele sunt ambalate în stații de momeală HDPE sau PP pentru momeală cu o singură utilizare sau stație reîncărcabilă rezistentă acțiunii externe. Toate ambalate în multiplii de 1/2/4 într-un ambalaj din carton la exterior sau blister sau din manșon din carton sau pungă sigilată prin căldură sau pungă din poliestiren închisă termic cu un capac din carton.

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: \*(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



Dimensiuni ambalaj: 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg 4,5 kg, 5 kg 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18kg, 19kg, 20kg;

1, 2 sau 3 x 15 g t-pungi fixate pe o bară metalică fixă într-o stație de șobolan HDPE sau PP de șobolan cu un singur sau multiplu de utilizare, ambalate în multipli de 1, 2 sau 4 într-o cutie de carton exterioară sau blister sau într-un manșon din carton sau pungi sigilate termic sau pungă poliestirenă închisă la cald și cu un capac din carton.

Multiple cutii pentru șobolani în ambalaj:

30g - 96, 120, 144

45g - 60, 72, 96, 120

60g - 48, 60, 72, 96

90g - 32, 48, 60, 72

120g - 32, 48, 60, 72

180g - 16, 24, 32, 48

1, 2, 3, 4 sau 5 x 10g t-pungi fixate pe o bară metalică fixă într-o stație de momeală HDPE sau PP de momeală pentru șobolani unică sau multifuncțională, ambalate în multipli de 1, 2, 3 sau 4 în carton exterior sau blister sau manșon din carton sau pungă sigilată la cald sau manșon din carton sigilat termic cu un capac din carton

Multiple cutii pentru șobolani în ambalaj:

10g -250

30g - 96, 120, 144

40g - 72, 96, 120, 144

50g - 60, 72, 96, 120, 144

60g - 48, 60, 72, 96, 120

80g - 32, 48, 60, 72, 96

90g - 32, 48, 60, 72, 96

100g - 32, 48, 60, 72, 96

120g - 24, 32, 48, 60, 72

150g - 24, 32, 48, 60, 72

160g - 16, 24, 32, 48, 60, 72

200g - 16, 24, 32, 48, 60

Momeală pastă în pachete PP sau PE pentru aplicare cu cuțitul / spatulul decoratorului.

Mărimea ambalajului: 2,5kg, 3kg 4,0kg sau 5,0kg.

Momeală pastă în cartuș lipit PE sau PP, etichetat cu sau fără ambalaj exterior din carton. Cartușele sunt de 50g, 100g, 150g, 200g sau 300g.

Mărimea ambalajului: 300g \*, 600g \*, 900g \*, 1,2 kg \* 1,8 kg \*, 2,4 kg \*, 3,6 kg

\* Excepție la mărimea minimă a pachetului pentru aceste momeli profesionale de specialitate care sunt utilizate în cantități foarte mici de către un controlor individual al dăunătorilor.

**XII. POSIBILE EFECTE ADVERSE DIRECTE SAU INDIRECTE**

Asupra sănătății umane:

Efecte adverse directe

Acest produs este un rodenticid anticoagulant de tip cumarinic, conține o substanță activă

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDALE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: \*(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



anticoagulantă (brodifacoum), derivată din cumarină care inhibă vitamina K și blochează formarea protrombinei. Dacă este înghițit, simptomele, care pot fi întârziate, pot include sângerarea nasului și a gingiilor. În cazuri severe, pot apărea echimoze și sânge în scaun sau urină.

Produsul este considerat periculos pentru sănătatea umana în concordanță cu Directiva 67/578/CEE și cu Regulamentul 1272/2008 (CLP), produsul poate provoca deteriorări ale organelor (sânge) în cazul unei expuneri repetate sau prelungite, operatorii trebuie să fie conștienți că substanța activă poate provoca probleme grave de sănătate în urma expunerii prelungite. Produsul conține un ingredient listat ca reprotoxic.

Efecte adverse indirecte. Efecte iritante principale

Corodarea/iritarea pielii : Nu are efecte iritante

Lezarea gravă/iritarea ochilor: Nu are efecte iritante

Sensibilizarea căilor respiratorii și a pielii : Nu este sensibilizant

Asupra sănătății animalelor nevizate : Riscuri specifice pentru sănătatea animală

Identificarea pericolelor

Vertebratele care nu sunt specii țintă pot fi expuse la substanța activă, fie direct prin ingestia de momeală rodenticidă sau a resturilor de momeală (intoxicare primară), fie indirect, prin înghițirea carcaselor de rozătoare specia țintă care conțin reziduuri ale substanței active (intoxicare secundară). Este necesară monitorizarea activității protrombinice imediat după ingestie și în zilele următoare. În caz de activitate protrombinică redusă, se va administra vitamina K.

Contraindicații: nu se vor administra anticoagulante.

Efecte adverse directe sau indirecte asupra animalelor:

Cele mai întâlnite semne de otrăvire sunt hemoragiile (hemoragii la nivelul mucoaselor, organelor și parenchimului), sânge în urină.

Asupra mediului: Sol: Trebuie evitată cât mai mult expunerea solului la produsul formulat precum și evitarea patrunderii în sol, ținând cont de proprietățile PBT ale brodifacoumului. Pe baza informațiilor disponibile nu este de așteptat ca produsul să inducă efecte adverse în mediu când este utilizat conform instrucțiunilor.

Apa : Substanța activă îndeplinește criteriile de PBT ; este persistentă în apă, cu tendințe de bioacumulare în organisme și foarte toxică .

Aer: Nu este de așteptat să rezulte pierderi, acumulări de substanță activă în aer în timpul utilizării.

Organismele acvatice : Produsul prezintă un risc acceptabil pentru organismele acvatice .

Alte organisme nețintă : Produsul nu prezintă risc neacceptabil pentru organismele din mediul terestru. Fără efecte semnificative asupra proceselor de respirație/nitrificare din sol.

**XIII. ORGANISMELE DĂUNĂTOARE VIZATE**

| Activitatea | Metoda de testare /Protocol de testare  | Specia   | Concentrații                        | Timpi de acțiune              |
|-------------|---|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| rodenticidă | Test de teren<br>Wade A. (2016)<br>în fermă de păsări(UK)<br>– patru locații;<br>statusul rezistenței | Șobolan<br>cenușiu<br><i>Rattus Norvegicus</i> | Brodifacum 25 ppm,<br>momeala pastă | Eficacitate 100 %, în 26 zile |

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDALE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: \*(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



|             |   |  |                                     |                                      |
|-------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
|             | necunoscut  |  |                                     |                                      |
| rodenticidă | <u>Test de teren</u><br>Wade A. (2016)<br>în fermă de păsări (UK);<br>locații: casa de odihnă și<br>de-a lungul pereților<br>unei magazii rurale;<br>statusul rezistenței<br>necunoscut | Șoareci de casă<br><i>Mus Musculus</i> | Brodifacum 25 ppm,<br>momeala pastă | Eficacitate– 100<br>%, după 14 zile. |

**XIV. INSTRUCȚIUNILE SI DOZELE DE APLICARE :**Manipulare:

Se va purta mănuși de protecție rezistente la produse chimice în timpul fazei de manipulare.

În timpul utilizării produsului nu se mănâcă, nu se bea și nu se fumează.

Spălarea mâinilor este obligatorie după manipulare, conținutul/recipientul se aruncă după utilizare în conformitate cu reglementările naționale.

Metoda de aplicare: Momeală pastă gata pentru utilizare în suporturi rezistente la manipulare.

Doza și frecvența aplicării: În interior, în exterior în jurul clădirilor

Pentru șoareci: 1 plic (12g sau 15g) sau 1-2 plicuri (10g) la distanță de 2-5m în stațiile de momeală rezistente la manipulare (la distanță de 2 m în zone cu infestări mari) în zonele în care șoarecii sunt activi.

Pentru șobolani: 1-4 plicuri de 15g sau 1-5 plicuri de 12 g sau 1-6 plicuri de 10 g la 5-10m distanță (la distanță de 5 m în zone cu infestări mari) în zonele în care șobolani sunt activi.

Verificați regulat consumul de momeală și înlocuiți momeala consumată sau stricată până când consumul se oprește. Dacă toată momeala a fost consumată din anumite zone, creșteți cantitatea de momeală prin plasarea mai multor puncte de momeală. Nu măriți mărimea punctului de momeală. Înlocuiți orice momeală mâncată de rozătoare sau care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pamant. Re-umpleți momeala când este necesar. Repetați tratamentul în situațiile în care există dovezi de infestare nouă.

Protejați momeala de condițiile atmosferice. Amplasați stațiile de momeală în zone care nu pot fi inundate.

În aer liber în jurul clădirilor - Profesioniști instruiți: Momeală gata de utilizare va fi utilizată în punctele de momeală acoperite sau în stațiile de momeală rezistente la manipulare. Galerii/vizuină: 1-6 plicuri (10 g) sau 1-5 plicuri (12 g) sau 1- 4 plicuri (15 g) de momeală per galerie. Controlați regulat consumul de momeală și înlocuiți momeala consumată sau stricată până când consumul nu se oprește. Repetați tratamentul în situațiile în care există dovezi de infestare nouă. Faceți inspecții frecvente ale momelilor de momeli în primele 10-14 zile. Momeală pulsată: Înlocuiți momeala mâncată numai după 3 zile și apoi la intervale de maximum 7 zile. În galerii: Trebuie să se introducă momeli pentru a minimiza expunerea la speciile nevizate și la copii. Acoperiți sau blocați intrările vâltorilor cu zgomot pentru a reduce riscul respingerii și vărsării momelii.

În sisteme de canalizare – pentru șobolani (doar profesioniști instruiți): Momeală gata de utilizare pentru a fi ancorată sau aplicată în stațiile de momeală care împiedică momeala să intre în contact cu apa reziduală. În canale, puneți 200g la 300g de momeală la fiecare 30-50m (nu mai mult de 300g de

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDALE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: \*(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



momeală la fiecare canal). Fixați plicurile la structurile disponibile pentru a vă asigura că momeala nu este spălată. Controlați regulat consumul de momeală și înlocuiți momeala consumată sau stricată până când consumul se oprește. Repetați tratamentul în situațiile în care există dovezi de infestare nouă.

**Profesioniști și profesioniști instruiți:** Efectuați o anchetă pre-tratament a zonei infestate și o evaluare la fața locului pentru a identifica speciile rozătoarelor, locurile lor de activitate și pentru a determina cauza probabilă și amploarea infestării. Dacă, după o perioadă de tratament de 35 de zile, momelile continuă să fie consumate și nu poate fi observată o scădere a activității rozătoare, trebuie determinată cauza probabilă. Produsul ar trebui utilizat numai ca parte a unui sistem integrat de gestionare a dăunătorilor (IPM), care include, printre altele, măsuri de igienă și, dacă este posibil, metode fizice de control. Trebuie luată în considerare și starea de rezistență a populației țintă la alegerea rodenticidului dorit de utilizat. În zonele unde dovada rezistenței la o substanță activă specifică este suspectată, evitați utilizarea lor. Nu spălați stațiile de momeală cu apă între aplicații. Atunci când plasați punctele de momeală în apropierea apelor de suprafață (de exemplu râuri, lacuri, canale de apă, baraje, canale de irigație) sau sistemelor de canalizare de apă, să vă asigurați că momeala nu intră în contact cu apa. Luați în considerare măsurile preventive de control (de exemplu, astupați găurile, eliminați alimentele potențiale și băuturile cât mai mult posibil) pentru a îmbunătăți aportul de produse și pentru a reduce probabilitatea de reinfestare. Nu curățați zona infestată chiar înainte de tratament, deoarece aceasta tulbura numai populația rozătoarelor și face ca acceptarea momeală să fie mai dificil de realizat. Stațiile de momeală trebuie plasate în vecinătatea imediată acolo unde activitatea de rozătoare a fost observată. Acolo, unde este posibil, stațiile de momeală trebuie fixate la pământ sau de alte structuri. Urmați instrucțiunile specifice furnizate de codul de bune practici aplicabil la nivel național. Nu folosiți momeli care conțin substanțe active anticoagulante ca momeli permanente.

**XV. INSTRUCIUNI DE PRIM AJUTOR**Descrierea măsurilor de prim ajutor

**Informații generale;** În caz de accident sau simptome de boală, consultați imediat medicul (Dacă este posibil, i se va arăta eticheta). Sfaturi pentru medici: brodifacoum este un anticoagulant indirect. Fitomenadiona - vitamina K1- este antidotul . Determinați timpul de protrombină în mai puțin de 18 ore după consum. În cazul în care valoarea este crescută , se va administra vitamina K1, până se normalizează timpul de protrombină Se va continua determinarea timpului de protrombină timp de două săptămâni după întreruperea tratamentului cu antidot și se reia tratamentul în cazul în care au loc creșteri ale valorilor în acel timp.

**Inhalare:** Datorită naturii fizice a acestui produs, expunerea pe această cale este puțin probabilă.

Consultați medicul dacă simptomele sunt grave sau persistă.

**Ingerare:** Clătiți bine gura cu apă. Nu provocați vomă. Consultați medicul imediat.

**Contactul cu pielea;** Poate provoca iritații ale persoanelor susceptibile . Dezbrăcați imediat toate hainele contaminate. Spălați bine pielea cu săpun și apă. Consultați medicul dacă simptomele sunt grave sau persistă după spălare

**Contactul cu ochii:** Poate provoca iritația ochilor la persoanele sensibile. Se clătește imediat cu multă apă și se va consulta un medic.



## MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: \*(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



Protecție pentru cei care acordă primul ajutor: Personalul de prim ajutor trebuie să poarte echipament de protecție adecvat în timpul oricărei acțiuni de salvare.  
Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate  
Informații generale: Gravitatea simptomelor descrise vor varia în funcție de concentrația și durata expunerii.

Inhalare: Putin probabil sa prezinte un pericol de inhalare. Dacă simptomele dezvoltă mutații persoana expusă la aer proaspăt. Imediat obțineți recomandări medicale.

Ingestie: Clățiți gura. Nu provocați vomă. Imediat un doctor.

Contactul cu pielea: Contactul prelungit poate provoca uscarea pielii.

Contactul cu ochii: Nici un simptom specific cunoscut. Poate fi ușor iritant pentru o

Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare:

Observații pentru medic; tratați simptomatic

### XVI. MĂSURI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

#### Restricții pentru utilizarea produsului biocid

Se va evita prin orice mijloace pătrunderea în sistemul de canalizare și în ape de suprafață. Nu se pun suporturile de momeala în apropierea sistemelor de drenare a apei acolo unde momeala ar putea intra în contact cu apa.

#### Măsuri în caz de dispersie accidentală.

În cazul deversărilor în apă, nu lasați să patrunda în apele de suprafață.

#### Metode de decontaminare

Stațiile și punctele de momeala sunt controlate la un interval de 2-3 zile ( în cazul soarecilor ), respectiv 5-7 zile ( în cazul sobolanilor ), iar momeala consumată este înlocuită. În timpul amplasării momelii folosiți manșuri de protecție.

În cazul în care rodenticidul poate ajunge pe sol trebuie să se ia măsuri imediate pentru colectarea lui și curățarea zonei.

În utilizarea profesională, recipientele, chiar dacă sunt complet goale, trebuie curățate înainte de eliminare.

### XVII. MASURI PENTRU PROTECTIA ANIMALELOR SI A HRANEI PENTRU ANIMALE

Atunci când sunt folosite în canalizări: trebuie să se introducă momeli pentru a minimiza expunerea la speciile nevizate.

Se va acoperi sau bloca intrările vâltorilor pentru a reduce riscul respingerii și vărsării momelii.

Plasați punctele de momeală în zone care nu sunt supuse inundațiilor.

Înlocuiți orice momeală în punctele de momeală în care momeala a fost avariata de apă sau contaminată de murdărie.

Pentru a reduce riscul otrăvirilor secundare, se vor elimina rozătoarele moarte în timpul tratamentului la intervale frecvente, în conformitate cu recomandările oferite de codul de bune practici.

Stația cu momeală trebuie să fie fixată în mod corespunzător și să permită doar accesul animalului vizat. Se va evita în acest fel dispersarea nedorită a momelii în mediu precum și accesul păsărilor, a animalelor domestice, a animalelor de fermă și a altor animale ( pisici, câini) cărora nu le este





## MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: \*(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



destinat produsul.

Se vor controla stațiile de momeală săptămânal și se vor înlocui momelile consumate în caz de nevoie. Se vor folosi mănuși adecvate în timpul manipulării animalelor moarte. La încheierea tratamentului, se vor elimina recipientele care conțin momeli neconsumate conform reglementărilor în vigoare.

Recipientele (stațiile de intoxicare) cu momeala, trebuie să fie poziționate în siguranță (securizat) în vederea minimalizării riscurilor de deschidere și ingerare accidentală de către animale pentru care momeala nu a fost destinată

Cutiile cu momeală trebuie să fie etichetate cu următoarele informații: „nu mutați sau deschideți”; „conține un rodenticid”;

Pentru a reduce riscul otrăvirii secundare prin ingestia rozătoarelor moarte în timpul tratamentului, acestea vor fi colectate și îndepărtate cel puțin de fiecare dată când se verifică suporturile de momeală.

Baiturile trebuie aplicate într-un mod astfel încât să nu intre în contact cu apa și să nu fie spălate. Îndepărtați alimentele ușor accesibile pentru rozătoare (de exemplu, boabe vărsate sau deșeuri alimentare). În afară de aceasta, nu curățați zona infestată chiar înainte de tratament, deoarece aceasta tulbura numai populația rozătoarelor și face ca acceptarea momeală să fie mai dificil de realizat.

Nu deschideți plicurile care conțin momeala (numai pentru pachetele de plicuri, nu momeală liberă).

Puneți stațiile de momeală departe de alimente, băuturi și hrana pentru animale, precum și de la ustensile sau suprafețe care au contact cu acestea.

Îndepărtați momeala rămasă sau stațiile de momeli la sfârșitul perioadei de tratament.

Dacă o politică sau o legislație națională o impune atunci când produsul este utilizat în zone publice, zonele tratate trebuie marcate în timpul perioadei de tratament și un aviz care explică riscul otrăvirii primare sau secundare de către anticoagulant, precum și indicarea primelor măsuri care trebuie luate în caz de otrăvire trebuie să fie puse la dispoziție alături de momeli.

### **XVIII. INSTRUCȚIUNI PENTRU ELIMINAREA ÎN SIGURANȚĂ pentru**

Eliminarea deșeurilor de produs și a ambalajelor acestuia se face în conformitate cu prevederile Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, de către operatorii autorizați. Produsul nu este destinat utilizării permanente (durata maximă de 35 zile).

Ambalaj: Se dispune de produs/recipient ca deșeuri periculoase. Nu se reutilizează ambalajul și nu se eliberează în mediu produsul biocid

**XIX. CONDITIILE DE DEPOZITARE :** Se depozitează în locuri inaccesibile, păsărilor, animalelor de companie și animalelor de fermă. A se depozita într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. Păstrați momeala în ambalajul original, închis și ferit de lumină directă a soarelui.

**DURATA DE CONSERVARE A PRODUSELOR BIOCID ÎN CONDITII NORMALE DE DEPOZITARE : 24 luni**

**XX. ALTE INFORMATII :** Având în vedere efectele adverse potențiale pentru sănătatea umană, se recomandă citirea cu maximă atenție a instrucțiunilor de pe eticheta și respectarea lor. Din cauza



**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE**  
**MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA  
Tel: \*(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



modului de acțiune anticoagulant întârziat al rodenticidelor, poate dura 4 - 10 zile pentru a avea efect după consumarea momelii. Rozătoarele pot fi purtătoare de boli. Nu atingeți rozătoarele moarte cu mâna goală, purtați mănuși și utilizați unelte (clește) când le îndepărtați. Acest produs conține o substanță amară și un colorant. Având în vedere efectele adverse potențiale pentru sănătatea umană, se recomandă citirea cu maximă atenție a instrucțiunilor de pe etichetă și respectarea lor.

Respectarea restricțiilor pentru utilizarea produsului biocid și anume: Se va evita prin orice mijloace pătrunderea în sistemul de canalizare și în ape de suprafață. Nu se pun suporturile de momeala în apropierea sistemelor de drenare a apei acolo unde momeala ar putea intra în contact cu apa.

Informații privind eficacitatea din etichete propuse:

**VERTOX PASTA BAIT (red)** - conține Brodifacoum 0,0025% w/w. (Ambalaj de 5 kg)

Momeală sub formă de pastă, gata de utilizare, care conține brodifacoum (0,0025%) pentru folosire ca rodenticid de către utilizatorii profesionali pentru combaterea șobolanilor și șoarecilor în interior și exterior, în jurul clădirilor, pentru protecția sănătății publice, a produselor și a materialelor depozitate. Detalii aplicare și strategia pentru folosirea momelilor. Interior și exterior, în jurul clădirilor (clădiri urbane și agricole).

Șobolani: momeală în cantități de 15-60 g în stații de intoxicare acoperite, protejate cu cheie care se plasează la interval de 10 m (5 m în zonele cu infestare ridicată) în zonele în care șobolanii au fost semnalati. Verificați la intervale regulate consumul momelilor și înlocuiți-le pe cele consumate, sau deteriorate, până consumul încetează. Repetați tratamentul în cazul infestațiilor nou apărute (ex. urme noi sau excremente). Nu mutați și nu deranjați stațiile de intoxicare timp de câteva zile după plasarea momelii. Dacă în 7-10 zile nu se semnalizează consumul momelii din stațiile de intoxicare mutați-le în altă zonă pe care o considerați infestată cu șobolani.

Șoareci: momeli de 15g în stații de intoxicare acoperite plasate la interval de 5 m (2 m în zonele cu infestare ridicată) în zonele în care au fost văzuți șoareci. Verificați la intervale regulate consumul momelilor și înlocuiți-le pe cele contaminate, sau deteriorate, până consumul încetează. Repetați tratamentul în cazul infestațiilor nou apărute (ex. urme noi sau excremente). Șoarecii sunt foarte curioși, și ar putea ajuta programul de combatere dacă ați muta momelile la interval de 2-3 zile, atunci când punctele de intoxicare sunt inspectate și reumplute. Controlați frecvent punctele de intoxicare în primele 10-14 zile și înlocuiți momelile consumate de rozătoare, cele afectate de apă sau contaminate de murdărie.

Dacă toată momeala a fost consumată, reîncărcați stațiile de intoxicare cu cantitatea de momeală maximă admisă și plasați mai multe stații de intoxicare. Înlocuiți momelile consumate de rozătoare, sau cele care au fost afectate de apă sau care au fost contaminate de murdărie. Nu măriți cantitatea de raticid în stația de intoxicare.

Informații privind rezistența: Trebuie să se țină cont de rezistența populației de rozătoare la brodifacoum atunci când se decide tipul de rodenticide care urmează a fi folosit. În cazul în care se constată, sau se suspectează rezistență la Brodifacoum, se va recurge la strategii de management al rezistenței.

Efectul biocid (activitate biocidă) apare după 3/6 ingerări repetate ale momelii, având drept timp de acțiune o perioadă cuprinsă între 3 și 15 zile. Nu curățați stațiile de intoxicare în timpul reîmprospătării momelii. Stațiile de intoxicare trebuie să conțină numai rodenticide. A nu se deschide pliculețul de momeală. Îndepărtați stațiile de intoxicare, când tratamentul este finalizat.



**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID**

**MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: \*(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

O inspecție minuțioasă a zonelor infestate este esențială, în special în locurile izolate și adăpostite, pentru a determina gradul de infestare.

Acolo unde este posibil, momelile se vor fixa pentru a nu fi trase și îndepărtate.

Instrucțiuni de depozitare: A se păstra la rece, într-un loc uscat și ventilat. Păstrați numai în recipientul original. ...

**PROCUM PASTĂ - MOMEALĂ RATICIDĂ (red) (100 g e)**

Substanță activă: 0,0025% Brodifacoum Nr. CAS 56073-10-0 Nr.CE 259-980-5

- anticoagulant de sinteză pe suport de pastă, ambalată în plicuri de 10 g.

Se folosește pentru combaterea șobolanilor și șoarecilor în locuințe, grajduri și clădiri agricole, grădini, depozite de deșeuri, cazărmi, magazii, vagoane, containere, etc. Se amplasează mai ales în zone umede, unde celelalte tipuri de raticide nu pot fi utilizate.

Instrucțiuni pentru utilizare: Se plasează momeală în galeriile active și locurile frecventate de șoareci și șobolani. Amplasarea se face în recipiente (tăvițe de carton, plastic) în locuri, ferite de lumină, umezeală, să nu permita accesul copiilor și animalelor domestice, în apropierea căilor de acces, a cuiburilor sau în locurile de hrănire a șobolanilor. În cazul în care este posibil, fixați momeala, astfel încât să nu poată fi deplasată. Pentru combaterea șobolanilor produsul se amplasează în cantitate de 1-6 plicuri la distanțe de 10 m (5 m în zone cu infestarea puternică), iar în cazul șoarecilor câte 1-2 plic la distanțe de 5 m (2 m în zone cu infestarea puternică). A se verifica regulat consumul otrăvii și a se înlocui otrava consumată sau împrăștiată până când încetează consumul. Repetați tratamentul în cazul unei noi infestări.

Prezenta autorizatie este însoțită de următoarele documente :

- proiect de etichetă a produsului biocid
- fisa cu date de securitate a produsului biocid
- rezumatul caracteristicilor produsului biocid

- I. Este obligatorie transmiterea de către detinătorul autorizației a fișei cu date de securitate către Institutul National de Sănătate Publică – Biroul RSI și Informare Toxicologică
- II. Prezentul document poate fi însoțit de anexă în cazul modificărilor administrative

Acest certificat reprezintă reinnoirea certificatului pentru autorizarea produsului biocid Nr. RO/2014/0064/MRA/ IE/BPA 70239+IE/BPA 70238.

Certificatul pentru autorizarea produsului biocid Nr. RO/2014/0069/MRA/ IE/BPA 70239+IE/BPA 70238 a fost anulat începând cu data de 05.11.2018.

PRESEDINTE,  
Dr. Chim. Gabriela Cilinca

