


Lancelot® Super

Dow AgroSciences

Conținut substanță activă: 30% aminopirialid + 15% florasulam
Erbicid postemergent, sistemic, selectiv pentru cereale, acționând asupra buruienilor dicotiledonate anuale și perene.



Cultura	Spectru de combatere	Doză	Temp de pauză
Grâu	Buruieni dicotiledonate anuale și perene	33 g/ha aplicat singur postemergent (primăvara de la înfrățire – al II-lea internod)	-
Orzoaică de primăvară	Buruieni dicotiledonate anuale și perene		

Lancelot® Super este un erbicid de ultima generație, cu o formulare granulată foarte concentrată, folosit la doze foarte mici.

Lancelot® Super este foarte bine translocat în plantă, rezultând un grad ridicat de combatere al buruienilor perene ca *Cirsium arvense*, *Bromus spp.* și *Sonchus arvensis*.

Creșterea buruienilor este stopată în decurs de o zi de la aplicare. Primele simptome vizibile (decolorarea și răsucirea frunzelor) se observă la 3-4 zile după erbicidare. Combaterea completă se realizează în 2-3 săptămâni după aplicare, depinzând de tipul de buruieni și de condițiile climatice.

Lancelot® Super prezintă activitate reziduală la sol, permițând combaterea buruienilor cu germinație târzie, prelungită.

Datorită activității reziduale la sol, perioada de combatere se prelungeste cu 1-3 săptămâni după aplicare.

Lancelot® Super este rapid absorbit de buruieni, iar ploile survenit la o oră după aplicare nu influențează eficacitatea produsului.

Recomandări de aplicare

Temperatura optimă de aplicare este între 8-25° C, dar tratamentele pot fi făcute începând de la 5°C, situație în care apariția simptomelor este încetinită, dar efectul final nu este afectat.

Pentru a obține cele mai bune rezultate, se recomandă să se erbicideze atunci când buruienile dicotiledonate au 2-6 frunze, iar în cazul infestării cu *Cirsium arvense*, maxim 10-15 cm înălțime.

Lancelot Super® este marcă înregistrată



Dow AgroSciences

Rotația culturilor

Culturile care pot fi înființate după aplicarea Lancelot® Super:

- După o lună (în caz de cultura calamitată): cereale, porumb, sorg. Solul trebuie arat înainte de semănat.
- Toamna: cereale, rapiță, pășune;
- Primăvara următoare: cereale, rapiță, floarea soarelui, ceapă, cartof, sfeclă de zahăr, lucernă, morcov, cicoare, in;
- După 14 luni: linte, năut, soia, fasole, mazăre.

* Încorporați prin arătura paiele provenite de la culturile tratate cu Lancelot® Super.

Lancelot® Super este oferit la ambalaje de 33 g și 500 g.